

乳幼児（園児）の登園停止期間について

| 疾患名 | 登園の目安 |
|---------------|--|
| インフルエンザ | 発症した後5日間経過していること、解熱して3日間以上経過していることの両方が確認できたら |
| 麻疹（はしか） | 解熱後3日間以上経過したら |
| 風疹（3日はしか） | 発疹が消えたら |
| 水痘（みずぼうそう） | すべての発疹が痂皮化（かさぶた）したら |
| 流行性耳下腺炎（おたふく） | 発症してから5日間以上経過していること、全身状態が良いことの両方が確認できたら |
| 咽頭結膜熱（プール熱） | 熱および目の充血などの症状が消失してから2日間以上経過したら |
| 流行性角結膜炎（はやり目） | 結膜炎の症状が消えたら |
| 百日せき | 特有の咳が消失していること、適正な抗生物質による治療が5日以上実施されていることのどちらかを確認できたら |
| 溶連菌 | 抗菌薬投与開始から24時間以上経過していること、解熱して全身状態が良いことの両方が確認できたら |
| 伝染性紅斑（りんご病） | 全身状態が良いこと（発疹が残っていても登園を禁止する必要はないとされています） |
| 手足口病・ヘルパンギーナ | 解熱して全身状態が良いこと（発疹が残っていても登園を禁止する必要はないとされています） |
| マイコプラズマ感染症 | 発熱や激しい咳などの主要な症状がないことを確認したら |
| ウイルス性胃腸炎 | 嘔吐・下痢などの症状が収まり、普段通りの食事が取れることが確認できたら |
| RSウイルス感染症 | 咳や鼻汁などの症状が軽快して、全身状態が良くなったら |
| 突発性発疹 | 解熱して機嫌・全身状態が良好になったら（発疹が残っていても登園を禁止する必要はないとされています） |
| 帯状疱疹 | すべての発疹が痂皮化（かさぶた）したら |
| その他の感染症 | 医師により感染の恐れがないと認められたら |

お大事になさってください。